

# 国家药品监督管理局

## 国家药品标准（修订）颁布件

批件号：ZGB2019-29

药品名称	中文名称：沉香化气胶囊 汉语拼音：Chenxiang Huaqi Jiaonang 英文名：-----		
剂型	胶囊剂	标准依据	局颁标准
原标准号	WS <sub>3</sub> -036 (Z-009) -2004 (Z)	审定单位	国家药典委员会
修订内容与结论	根据《药品管理法》及其有关规定，同意修订薄层鉴别项。		
实施规定	本标准自颁布之日起6个月内，生产企业按原标准生产的药品仍按原标准检验，按本标准生产的药品应按本标准检验。自本标准实施之日起，生产企业必须按照本标准生产该药品，并按照本标准检验，原标准同时停止使用。 请各省、自治区、直辖市药品监督管理局及时通知辖区内有关药品生产企业，自实施之日起执行修订后的国家药品标准。		
标准号	WS <sub>3</sub> -036 (Z-009) -2004 (Z) -2019	实施日期	2019年10月28日
附件	沉香化气胶囊药品标准		
主送单位	各省、自治区、直辖市药品监督管理局，中央军委后勤保障部卫生局		
抄送单位	各省、自治区、直辖市（食品）药品检验院（所），中国人民解放军联勤保障部队药品仪器监督检验总站，中国食品药品检定研究院，国家药典委员会，国家药品监督管理局药品审评中心，国家药品监督管理局药品审核查验中心，国家药品监督管理局药品评价中心，国家药品监督管理局信息中心，国家药品监督管理局药品注册管理司，国家药品监督管理局药品监督管理司。		
备注			



# 国家药品监督管理局

# 国家药品标准

WS<sub>3</sub>-036 (Z-009) -2004 (Z) -2019

## 沉香化气胶囊

Chenxiang Huaqi jiaonang

【处方】 沉香	74g	木香	148g	广藿香	296g
醋香附	148g	砂仁	148g	陈皮	148g
醋莪术	296g	炒六神曲	296g	炒麦芽	296g
甘草	148g				

【制法】 以上十味，沉香、砂仁粉碎成细粉备用；木香、广藿香、香附、陈皮和莪术加水浸渍后蒸馏，收集馏出液 2000ml，取出芳香油用 10 倍量β-环糊精包合后备用，药渣、水馏液与六神曲、麦芽、甘草合并加水适量，90℃温浸二次，每次 2 小时，合并水提液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.4 (55~60℃) 的稠膏，与上述细粉混合，低温干燥，粉碎成细粉，与包合物混匀，加糊精适量，混匀，装入胶囊，制成 1000 粒，即得。

【性状】 本品为胶囊剂，内容物为黄棕色粉末；气香，味微甜、苦。

【鉴别】 (1) 取本品内容物，置显微镜下观察；纤维管胞壁略厚，有具缘纹孔，纹孔口人字状或十字状（沉香）。内种皮厚壁细胞黄棕色或棕红色，表面观类多角形，壁厚，胞腔含硅质块（砂仁）。

(2) 取本品内容物 4.5g，置 500ml 圆底烧瓶中，加水 200ml，浸泡过夜，连接挥发油测定器，自测定器上端加水使充满刻度部分，并溢入烧瓶时为止，再加入乙酸乙酯 1ml，加热回流 3 小时提取挥发性成分，将挥发油测定器中的液体移至分液漏斗中，分取乙酸乙酯液作为供试品溶液；另取百秋李醇对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2015 年版通则 0502）试验，吸取供试品溶液 4~8μl、对照品溶液 2μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯（30:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以盐酸酸性 5% 三氯化铁乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 应符合胶囊剂项下有关的各项规定（中国药典 2015 年版通则 0103）。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典 2015 年版通则 0512）测定。

**色谱条件与系统通用性试验** 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（37:63）为流动相；检测波长为 284nm。理论板数按橙皮苷峰计算应不低于 2000。

**对照品溶液的制备** 取橙皮苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 40 $\mu\text{g}$  的溶液，即得。

**供试品溶液的制备** 取本品装量差异项下的内容物，混匀，取 1.5g，精密称定，置 50ml 量瓶中，加甲醇适量，超声处理 1 小时，放至室温，加甲醇至刻度，摇匀，放置，取上清液用微孔滤膜（0.45 $\mu\text{m}$ ）滤过，即得。

**测定法** 精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 5 $\mu\text{l}$ ，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每粒含陈皮以橙皮苷（C<sub>28</sub>H<sub>34</sub>O<sub>15</sub>）计，不得少于 0.60mg。

**【功能与主治】** 理气疏肝，消积和胃。用于肝胃气滞，脘腹胀痛，胸膈痞满，不思饮食，嗳气泛酸。

**【用法与用量】** 口服。一次 3 粒，一日 2 次。

**【注意】** 孕妇慎用。

**【规格】** 每粒装 0.45g

**【贮藏】** 密封。